NeutroDes

Oberflächenaktives Desinfektionsmittel ohne Mechanik & Hygienisierung der Hände

Verwendungszweck

- Für den professionellen und privaten Bereich.
- Desinfektion von Oberflächen, die nicht für eine direkte Berührung mit Lebens- oder Futtermittel verwendet werden.
- Desinfektion im Routinebetrieb bei medizinischen und nicht medizinischen Einrichtungen.
- Handhygiene.

Laborgeprüfte Wirksamkeit gegen Coronaviren!

NeutroDes ist verfügbar: im 5 Liter Kanister, in der 1 Liter Flasche, als 250 ml und 100 ml Pumpspray

Produkteigenschaften

- Kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-VO.
- Ohne Alkohol, ohne Tenside und Aldehyde.
- Nicht brennbar.
- Bakterizid, levurozid, viruzid, sporozid, fungizid
- hergestellt in Deutschland
- IHO-gelistet (Industrieverband, Hygiene & Oberflächenschutz)
- Dermatest Urteil "Sehr Gut"

Moderne Wirkstoffe

Formulierung:	gebrauchsfertige wässrige Lösung
Inhaltsstoffe:	H_2O; NaCl; NaOCl; NaOH
Wirkstoff:	Natriumhypochlorit
Konzentration:	1800 mg / l
CAS-Nr.:	7681-52-9
EG-Nr.:	231-668-3 EN 14348:2005
Reg.Nr.BauA.:	N-79218
BfR Produktenr.:	7656785
IFA-Liste PZN:	16589584

Labor geprüfte Wirksamkeit

Bakterizid	EN13727:2015 EN13697:2015
Levurozidie	EN14348:2005
Mikrobakterizidie	EN13697:2015 FprEN17126:2018
Sporizidie	EN13624:2013
Fungizidie	EN13697:2015
Viruzid	EN14476:2013

Anwendung Oberfläche

- Vor der Desinfektion grobe Verschmutzungen entfernen.
- Fertiglösung aus ca. 30 cm Abstand aufsprühen.
- Oberflächen vollständig benetzen (min. 50 ml / m^2).
- Mindesteinwirkzeit laut IHO Liste 5 Minuten und bei der prophylaktischen Oberflächendesinfektion 1 Minute
- Bei Bedarf trocken wischen.
- Anwendung nur durch unterwiesene Personen.

Anwendung Handhygiene

- Unverdünnt. 3-5 ml bzw. eine hohle Hand für beide Hände laut Standardeinreibeverfahren auftragen
- Auf vollständige Benetzung achten
- Das Einreiben muss für 1 Minute erfolgen.
- Die einzelnen Schritte jeweils für 5 Sekunden ausführen, bis die Einwirkzeit erreicht ist.

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Darf nicht mit Säuren oder Laugen gemischt werden.
- Darf nicht mit anderen Flüssigkeiten / Stoffen vermischt werden.
- Darf nicht in herkömmliche Spender eingefüllt werden. Hier kommt es zu Korrosionen im Anschlusskopf.
- Bei Temperaturen nicht über 20 °C / 68 °F aufbewahren.
- Vor Sonnenbestrahlung schützen; Kühl halten.
- Restentleerte Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
- Auf Oberflächen Materialverträglichkeit vor Erstanwendung prüfen.
- Bei allen Arbeitsschritten zwingend Kontakt mit Kleidung vermeiden.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Nicht auf blankes Metall anwendbar (nicht auf nicht-passivierte Oberflächen anzuwenden)
- Nach Anbruch binnen 30 Tagen verbrauchen.
- Nach Gebrauch fest verschließen und zwingend kühl lagern.

* BIOZID SICHER UND VORSICHTIG VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATION LESEN! *